Kosmologie und Astroteilchenphysik

Prof. Dr. Burkhard Kämpfer, Dr. Daniel Bemmerer

- Einführung in die Kosmologie
- Weltmodelle und kosmologische Inflation
- Thermische Geschichte des Universums
- Urknall-Nukleosynthese
- Dunkle Energie, dunkle Materie und die beschleunigte Expansion des Universums
- Kosmische Mikrowellen-Hintergrundstrahlung
- **Supernovae als kosmische Standardkerzen (heute)**
- Neutronensterne
- Entstehung und Nachweis kosmischer Strahlung
- Altersbestimmung des Universums
- Fundamentale Physik und die Sonne

8. Vorlesung, 27.05.2014

TECHNISCHE
UNIVERSITÄT
DRESDEN

History of the Universe

BICEP2 Daten zur Polarisation des Mikrowellen-Hintergrunds

BICEP2-Instrument

- ◆ Mikrowellen-Teleskop am Südpol
- ◆ Nachweis der Polarisation der Mikrowellen-Quanten
- ◆ 4 * 128 Bolometer
- ◆ Bilder: arXiv (BICEP2)

Polarisation des Mikrowellen-Hintergrunds: Erwartung

Observable für lineare Polarisation

- ◆ E = Polarisation in Richtung des Wellenvektors (+) oder orthogonal dazu (-)
- ◆ B = Polarisation bei $+ / - 45^\circ$

Hu et al. 2002

Polarisation des Mikrowellen-Hintergrunds: BICEP2-Daten (1)

Polarisation des Mikrowellen-Hintergrunds: BICEP2-Daten (2)

RIPPLE EFFECT

When a gravitational wave passes through space, it compresses it in one direction and stretches it in another, both at right angles to the wave's direction (red line). The effects of the wave moving along a blue tube are shown.

R. Cowen, Nature News 2014

Supernovae: Klassifizierung

- Klassifizierung anhand der Spektallinien
- Wasserstoff aus äußerster Zwiebelschale oder nicht?

B. Leibundgut

Supernovae vom Typ Ia und II, Theorien... und Beobachtungen

Supernovae Typ Ia

- Weißer Zwerg saugt Material von einem Begleiter auf
- Kurz vor Erreichen der Chandrasekhar-Masse zündet thermonukleares Brennen
- Keine H-Spektrallinien
- Kein Überrest
- Standardkerzen, aufgrund einer empirischen Kalibration
- Kosmologische Anwendung
→ Nobelpreis für Physik 2011

Supernovae Typ II

- Schwerer Stern erlebt einen Kernkollaps
- H-Spektrallinien beobachtet
- Überrest ist ein Neutronenstern

Supernovae vom Typ Ia und II, Vorgängersterne

Typ Ia

Vorgänger

- Leichter Stern, ~ 1 Sonnenmasse
- Wasserstoff-, dann Heliumbrennen
- Asche: ^{12}C ($\sim 50\%$), ^{16}O ($\sim 50\%$), ^{22}Ne (2%)
- Weißer Zwerg

Supernova-Explosion (Typ Ia)

- Explosives thermonukleares Brennen (Kohlenstoff- und Sauerstoffbrennen)

Typ II

Vorgänger

- Schwere Stern, ~ 25 Sonnenmassen
- H, He, C/O, Si - Brennen
- Zwiebelstruktur

Supernova-Explosion (Typ II)

- Kernkollaps

core collapse - Supernova: SN 1987A

SN 1987A

Woosley et al. 2002

- Massiver Stern
- Vor der Explosion Schalenbrennen

D. Arnett et al.

Entfernungsmessung mittels Parallaxe, Prinzip

Mittlerer
Erdbahnradius
= 1 AU
(astronomical
unit)

$$d = \frac{1 \text{ AU}}{\tan \alpha}$$

- Gute Winkelauflösung vonnöten
- Lange Basislinie hilft (→säkulare Parallaxe)
- Definition der Längeneinheit parsec (pc, Parallaxsekunde):
 $1 \text{ pc} = 1 \text{ AU} / \tan 1''$ (Bogensekunde) = $2.06 \cdot 10^5 \text{ AU} = 3.26 \text{ Lichtjahre}$
- 1838 von Bessel auf 61 Cyg angewendet: $\alpha = 0.314''$
 $d = 1 / 0.314 \text{ pc} = 3.18 \text{ pc} = 10.4 \text{ Lichtjahre}$

Bestimmung der Entfernung des 61^{sten} Sterns des Schwans.
Von Herrn Geheimen-Rath und Ritter *Bessel*.

Als es *Bradley* gelungen war, seine Beobachtungen in *Kew* und *Wansted*, welche die Entdeckungen der Aberration und Nutation herbeiführten, durch diese allein genügend zu erklären, ohne dazu der Annahme einer jährlichen Parallaxe der beob-

ist nicht zu bezweifeln; allein wenn eine Untersuchung über die jährliche Parallaxe eines Fixsterns unternommen werden soll, so sind sie dennoch die einzigen, welche seine Wahl leiten können.

HZDR

Entfernungsmessung mittels Parallaxe, moderne Anwendung

Parallaxenmessungen mit Hubble Space Telescope, auf 10^{-4} Bogensekunden genau:
G. Benedict et al., Astron. J. 133, 1810 (2007)

Zu bestimmender
variabler Stern (I Car)

Referenzsterne
2-11

500
Bogensekunden

Karte aus Digital Sky Survey (nur zur Illustration)

Erdgestützt (8 m)

Hubble-Satellit (2.4 m)

Entfernungsmessung mittels Standardkerze: Prinzip

- Quadratisches Abstandsgesetz: $\Phi \sim d^{-2}$
- Helligkeit in Magnituden m : $m = -2.5 \log_{10} \Phi + C$
- Referenzstern in 10 pc Abstand: Fluss Φ_0 , Helligkeit M

$$d = 10 \text{ pc} \cdot 10^{(m-M)/5}$$

Standardkerzen mit empirischer Kalibrierung sind zum Beispiel:

- Veränderliche Sterne (Cepheiden, M hängt linear von der Periode ab)
- Supernovae vom Typ Ia (Helligkeit M im Maximum hängt von der Form der Lichtkurve ab)

Standardisierung der Lichtkurve von Supernovae Ia

- Untersuchung einer Vielzahl von Supernovae vom Typ Ia
- Sehr helle, recht häufig auftretende Ereignisse
- Kalibrierung anhand der Form der Lichtkurve

	^{56}Ni 6.075 D $\epsilon: 100.00\%$	^{57}Ni 35.60 H $\epsilon: 100.00\%$	^{58}Ni STABLE 68.077%
	^{55}Co 17.53 H $\epsilon: 100.00\%$	^{56}Co 77.236 D $\epsilon: 100.00\%$	^{57}Co 271.74 D $\epsilon: 100.00\%$
	^{54}Fe STABLE 5.845%	^{55}Fe 2.744 Y $\epsilon: 100.00\%$	^{56}Fe STABLE 91.754%
	^{53}Mn $3.74E+6$ Y	^{54}Mn 312.12 D	^{55}Mn STABLE

Entfernungsmessung mittels Standardkerze: Supernova Ia

- Supernova vom Typ Ia = Weißer Zwerg, der Material von einem Begleitstern ansaugt
- Explosives Kohlenstoff- und Sauerstoff-Brennen
- Sehr helle, recht häufig auftretende Ereignisse
- Referenzhelligkeit M empirisch kalibrierbar (durch Lichtkurve, Infrarotemission)

Entfernungsmessung und Kosmologie (1)

Weit entfernte Supernovae sind lichtschwächer als erwartet!
Evidenz für eine kosmologische Konstante $\Omega_\Lambda > 0$.

$$\frac{\ddot{a}}{a} = -\frac{4\pi G}{3c^2}(\rho c^2 + 3p)$$

Licht-
schwächer

$$\Omega_M = 0.3, \Omega_\Lambda = 0.7$$

$$\Omega_M = 0.3, \Omega_\Lambda = 0.0$$

$$\Omega_M = 1.0, \Omega_\Lambda = 0.0$$

schneller

Entfernungsmessung und Kosmologie (2)

$$\frac{\ddot{a}}{a} = -\frac{4\pi G}{3c^2}(\rho c^2 + 3p)$$

Zusammenfassung

- Supernovae
- core collapse - Supernovae
- Thermonukleare Supernovae (Typ Ia)
- Entfernungsmessung im Universum